

**ダラキューロ（皮下注）療法**

医薬品名	投与日	投与量	投与方法	投与時間
ダラキューロ配合皮下注	Day1	15mL/Body	皮下注射	約3～5分かけて

カロナール 1000mg、デカドロン20mg、ポララミン10mgをダラキューロ投与1～3時間前に内服

**wKd療法（週1回）（2クール目以降）（1クール4週）**

医薬品名	投与日	投与量	投与方法	投与時間
カイプロリス点滴静注用	Day1・8・15	70mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分かけて
5%糖液		50mL		

デカドロン40mg（Day1・8・15・22）

カイプロリス投与4時間～30分前にデカドロンを投与する

**ERd療法（3クール目以降）**

医薬品名	投与日	投与量	投与方法	点滴時間
デカドロン注射液3.3mg/1mL	Day1・15	2A	点滴	15分かけて
生食		50mL		
エンプリシティ点滴静注用	Day1・15	10mg/kg	点滴	300mL/h
生食				

レブラミドDay1～21

エンプリシティ投与30～90分前にポララミン2mg、ファモチジン20mg、カロナール600mg内服（Day1・15）

デカドロン28mgをエンプリシティ投与3～24時間前に内服（Day1・15）

デカドロン40mgをエンプリシティ投与3～24時間前に内服（Day8・22）

**ボルテゾミブ（皮下投与週1回）**

医薬品名	投与日	投与量	投与方法	投与時間
ボルテゾミブ注射用	Day1・8・	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下投与	
生食	15・22			